



SIRINGA GEL ANTIFORMICHE

Cod. 334001325040

Confezione: Blister contenente 1 siringa da 10g

Dimensione: 8,8 x 2,5 x 20,0 cm (bxpxh)

Imballo: 12 pz. in display box da banco

Categoria: Insetticidi

Composizione (per 100 g): Imidacloprid 0,01 %;

Denatonio Benzoato 0,008 %

Ideale contro: Formiche



CARATTERISTICHE:

EC GEL FORMICHE è un insetticida in formulazione gel efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*). Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte di persone o animale non bersaglio. EC GEL FORMICHE può portare all'eradicazione dell'intera colonia: Il suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato Trofallassi, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

MODALITÀ D'USO E DOSI D'IMPIEGO:

L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), il prodotto va applicato nei posti di maggiore presenza: grondaie, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature. EC GEL FORMICHE deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.

Dose: 0.2g/m² (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza).

Frequenza di applicazione: Dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

Frequenza del trattamento: Il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.